

Бесплатное приложение для пациентов

- ♦ Все записи к врачу в одном месте
- ♦ Безопасная электронная медкарта
- ♦ Защищенный канал передачи документов
- ♦ Удобная онлайн-запись



ООО "Медичел"

Информированное добровольное согласие на проведение обследования на ВИЧ

(основание Статья 20 ФЗ "О охране здоровья граждан РФ" № 323 от 21.11.2011г.; СанПиН 3.3686-21

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и МР

3.1.5.0076/1-13 «До- и послетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ»)

г,Новосибирск

"__"_____202__г. Я, Иванов Иван Иванович, 1980 года рождения, настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о последствиях обследования, принял(а) решение пройти тестирование на антитела к ВИЧ в ООО "Медичел" по адресу Новосибирск, ул.Российская, д.21 о проведении мне венопункции - забора крови из вены для проведения лабораторных исследований на ВИЧ.

Я подтверждаю, что я ознакомлен (а) с характером предстоящих манипуляций. Мне разъяснены, и я понимаю особенности и ход предстоящей манипуляции, ее необходимость для правильной диагностики и последующего лечения.

Мне в доступной форме разъяснено, что ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, отличается поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Для этой цели я соглашаюсь сдать анализ крови. Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти тестирование на ВИЧ, как проводится тест и какие последствия может иметь тестирование на ВИЧ. Я проинформирован, что:

- тестирование по моему добровольному выбору может быть добровольным, анонимным (без предъявления документов и указания имени) или конфиденциальным (при предъявлении паспорта, результат будет известен обследуемому и лечащему врачу);
- доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител к ВИЧ в крови обследуемого лица.

Вместе с тем, в период между заражением и появлением антител к ВИЧ (так называемое "серонегативное окно", обычно 3 месяца) при тестировании не обнаруживаются антитела к ВИЧ и обследуемое лицо может заразить других лиц;

•ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:

- парентеральный - чаще всего при употреблении наркотиков, но может передаваться также при использовании нестерильного медицинского инструментария, переливании компонентов крови, нанесении татуировок, пирсинге зараженным инструментом, использовании чужих бритвенных и маникюрных принадлежностей;
- при сексуальных контактах без презерватива;
- от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

Мне разъяснено, что для проведения исследования на антитела к ВИЧ из локтевой вены берется 5–10 мл крови, которая подвергается дальнейшему обследованию в медицинских учреждениях, имеющих разрешение на такую деятельность. В случае получения сомнительного или положительного результата, кровь направляется на дообследование в территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИД. В этом случае, срок выполнения анализа увеличивается до 10 рабочих дней. Общий результат тестирования крови на антитела к ВИЧ может быть положительными (антитела к ВИЧ обнаружены), отрицательными (антитела к ВИЧ не обнаружены) или неопределенными.

Я понимаю, что проведение забора крови, проводится в процедурном кабинете медицинской

сестрой в условиях надлежащей чистоты и асептики (комплекс мероприятий, направленный на предотвращение попадания микроорганизмов в рану) с использованием полностью одноразового инструментария и расходных медицинских материалов.

Я подтверждаю, что уведомлен(а) об особенностях забора венозной крови и подтверждаю, что последний прием пищи был за 10 ч до процедуры.

Я информирован (а) о том, что даже при наивысшей степени осмотрительности и аккуратности проведения процедуры, возможно травмирование стенки сосуда с ее полным проколом, в результате чего происходит излитие крови в окружающие ткани (возникновение отека, гематомы). В данной ситуации венепункцию прекращают и проводят инъекцию в другую вену, а на область гематомы накладывают повязку. Для полного восстановления стенки сосуда и исчезновения признаков гематомы необходимо продолжительное время. Я информирована(а) о том, что при инъекции возможны незначительные болевые ощущения в момент прокола вены.

Я понимаю, что для предотвращения появления постинъекционной гематомы (синяк после укола) рекомендуется в течение 15 минут не снимать спиртовой компресс с места инъекции и давящую повязку, наложенную медицинской сестрой.

Я понимаю, что для наилучшего проведения данной процедуры, а также предотвращения возможных неблагоприятных последствий, я сообщаю об особенностях ранее проведенных внутривенных вмешательств: (обморок, обширная гематома и пр.)

- Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска и пользе манипуляций, и медицинский персонал дал понятные мне исчерпывающие ответы.

До меня доведено, что результаты тестирования на ВИЧ по телефону не сообщаются.

_____Иванова Ивана Ивановича

Дата _____

_____ (_____)

Дата _____

ФИО медработника